

Novo tratamento contra as Processionarias



Processionaria do Pinheiro ou como é vulgarmente conhecida, Lagarta do Pinheiro, é a seguir aos fogos florestais é o segundo factor de destruição dos Pinhais. Os períodos de tempo indicados podem variar devido as condições climáticas, fogos, etc.....




Figura 1 – Ciclo de vida da processionária

O seu ciclo de vida é composto por 3 fases: Fase aérea, terrestre e subterrânea.

Fase Aérea: Julho a Setembro.

Nesta fase a lagarta assume a forma de uma borboleta que após sair dos casulos, acasalam e fazem a postura de ovos nas folhas do Pinheiro. Por vezes não são facilmente detectadas pois têm hábitos noturnos.

Fase Terrestre: Setembro a Fevereiro

Depois da eclosão dos ovos as lagartas passam por 5 fases de crescimento sendo que a partir da 3 fase ganhem os perigosos pelos urticantes. Estas alimentam-se das folhas do Pinheiro. É também nesta altura que começam a formar os ninhos brancos que se vêem no cimo dos Pinheiros para se poderem abrigar do mau tempo. Neste período só sem do ninho para se alimentar e regressam depois de acabar a refeição. Quando termina a sua completa formação iniciam a sua ultima fase do seu ciclo de vida.



Fase Subterrânea: Fevereiro a Junho

Agora as Lagartas iniciam a sua descida até ao solo em procissão em busca de um lugar no solo onde de possam enterrar par formar um casulo e transformar-se novamente em Borboleta. Assim se inicia novamente o seu Ciclo de Vida.

Para a resolução do Problema recorre-se a Pulverizações em altura , o que em zonas urbanas pode contaminar zona próximas, e muitas vezes são feitas em altura de Chuvas o que vai diminuir a eficácia do tratamento.

Desta forma aconselhamos o método de tratamento por Micro-injecção, que consiste na injeção de um insecticida Próprio no pinheiro, o qual será absorvido por este, contaminando-o. Assim quando as lagartas começam a alimentar-se das sua folhas, ficam intoxicadas e morrem, não chegando a fazer os ninhos, .



As Principais vantagens deste tratamento são: Facilidade do tratamento

sem colocar as zonas vizinhas em perigo, pode ser aplicado a qualquer hora do dia, Duração do tratamento pode ir de 1 a 2 Anos,

O período mais favorável para estes tratamentos é de Setembro a Dezembro, podendo ser aplicado em qualquer altura.